

Erkrankung	Krankheitszeichen (u.a.)	Schul-Besuch?	wann zum Kinderarzt? (u.a.)	Hygienetipps	ärztliches Attest
grippaler Infekt	<ul style="list-style-type: none"> Husten Schnupfen Kopfschmerzen ggf. erhöhte Temperatur 	<p>ja bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> Temp. < 37,5°C (ohne Medikamente) allgemeinem Wohlbefinden <p>nein bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> Temp > 37,5°C Krankheitsgefühl Husten mit starkem Auswurf 	<ul style="list-style-type: none"> anhaltendes Fieber > 39°C starkes Krankheitsgefühl Trinkverweigerung starke Schmerzen Nackensteifigkeit grün/gelblicher Auswurf blutiger Husten starke Ohrenschmerzen Wesensveränderung 	<ul style="list-style-type: none"> regelmäßiges Händewaschen eigenes Handtuch nutzen Taschentuch nur 1x benutzen verschwitzte Kleidung wechseln Niemanden anhusten oder anniesen am besten ein Papiertaschentuch vor den Mund / die Nase halten, oder in den Ärmel husten oder niesen 	nein
Magen-Darm-Infekt	<ul style="list-style-type: none"> Erbrechen Durchfall (mehr als 3 ungeformte Stühle in 24 Stunden) ggf. erhöhte Temperatur ggf. Bauchschmerzen ggf. Trink- / Eißverweigerung 	<p>ja bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> kein Durchfall / Erbrechen in den letzten 48 Stunden Temp. < 37,5°C (ohne Medikamente) allgemeinem Wohlbefinden <p>nein bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> akuten Beschwerden Temp > 37,5°C Krankheitsgefühl 	<ul style="list-style-type: none"> anhaltendes Fieber > 39°C starkes Krankheitsgefühl Trinkverweigerung starke Schmerzen blutiger Stuhl Wesensveränderung 	<ul style="list-style-type: none"> regelmäßiges Händewaschen eigenes Handtuch nutzen ggf. Händedesinfektion regelmäßige Reinigung der Toilette (ggf. inkl. Desinfektion) verschwitzte Kleidung wechseln keine Durchfallstopper (z.B. Imodium®) benutzen 	nein
Kopfläuse, Krätze & Co.		<p>Fallen meist durch Juckreiz, Brennen, Pusteln oder Entdecken der „Tierchen“ auf. Läuse können Sie selbst mit einem Mittel aus der Apotheke behandeln. Bei einem ersten Befall mit Läusen ist ein ärztliches Attest nicht zwingend erforderlich, im Wiederholungsfall häufig doch. Bei Verdacht auf Krätze (Scabies) sollten Sie den Kinderarzt oder einen Hautarzt aufsuchen. Ein ärztliches Attest zur Wiederzulassung ist zwingend erforderlich.</p>			
Hautausschlag		<p>Jeder neu aufgetretene und anhaltende Hautausschlag sollte vom Kinderarzt abgeklärt werden. Dies ist vor allem erforderlich, wenn zusätzliche Krankheitszeichen wie Fieber, Abgeschlagenheit und/oder Wesensveränderung bestehen.</p>			
„Kinderkrankheiten“ (u.a. Masern, Mumps, Röteln, Windpocken ...)		<p>Immer, wenn Verdacht auf eine ansteckende Kinderkrankheit besteht, sollte zeitnah der Kinderarzt oder der ärztliche Notdienst aufgesucht werden. Diese Krankheiten sind im Allgemeinen ansteckend und können für Ihr Kind gefährlich verlaufen. Wann Ihr Kind wieder in die KiTa darf, entscheidet der Arzt in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt. Bitte denken Sie daran, Ihr Kind impfen zu lassen und überprüfen auch Sie regelmäßig, ob Ihr Impfschutz noch ausreichend ist.</p>			

Wenn bei Ihrem Kind ein bestimmter Krankheitserreger (z.B. Norovirus, Hepatitisvirus, Salmonellen ...) nachgewiesen wurde, hat dies ggf. Einfluss auf die o.g. Informationen. In diesen Fällen berät Sie das Gesundheitsamt gerne zur Frage der Wiederzulassung (☎ 02251 - 15-0).